



فترة شهر العسل

Honeymoon period

فترة شهر العسل:

عندما يُشخّص داء السكري من النوع الأول تكون ٨٠-٩٠% من خلايا بيتا في البنكرياس قد توقفت عن العمل . ولكن بعد العلاج بالأنسولين قد تنشط بعض الخلايا المتبقية عند بعض الأشخاص وتقوم بإفراز كمية من الأنسولين مرة أخرى

متى تحدث وكيف أعرف أن طفلي يمر بمرحلة شهر العسل؟

تحدث في السنة الأولى من بعض التشخيص وأعراضها انخفاض سكر الدم المتكرر بدون سبب في بداية التشخيص

ماذا أفعل في هذه المرحلة؟

تقليل جرعات الأنسولين بما يتناسب مع مستوى السكر في الدم والتواصل مع الفريق الطبي المختص

كيف أعرف أن هذه المرحلة انتهت؟

ستلاحظ ارتفاع مستوى السكر وعندها يجب أخذ الأنسولين والتواصل مع الفريق الطبي المختص



الفرق بين قراءات السكر في فترة شهر العسل وعند الخروج منها:



خارج شهر العسل



شهر العسل مع تكرار الأنخفاضات عند اعطاء الانسولين

إعداد:

المركز الجامعي للسكري ووحدة التثقيف الصحي