



تعليمات للمريض بعد علاج
عصب الأسنان



الشعور بالألم والتورم بعد العلاج



- من الطبيعي أن يشعر المريض ببعض الألم والانزعاج بعد علاج عصب السن مثل الحساسية عند الضغط على السن أو الألم التلقائي البسيط.
- يمكن تناول المسكنات التي يتم وصفها من قبل طبيب الأسنان لتقليل الألم مع اتباع التعليمات المُعطاة.

الأكل و المضغ



- تجنب مضغ الأطعمة الصلبة أو اللزجة التي قد تتسبب في تلف السن المعالج أو الحشوة المؤقتة حتى يتم علاج السن بشكل كامل.
- تناول الأطعمة اللينة و امضغ الطعام على الجانب الآخر عند الضرورة.

العناية بنظافة الفم والأسنان



يجب الحفاظ على روتين نظافة الفم والأسنان وذلك باستخدام الفرشاة و المعجون مرتين باليوم على الأقل و استخدام خيط الأسنان يومياً. كما يجب الحذر عند تنظيف السن المعالج لتجنب سقوط الحشوة المؤقتة.

ننصح بمراجعة الطبيب



- في حال سقوط الحشوة المؤقتة.
- إذا واجهت ألم شديد أو زيادة تدريجية بالألم لأكثر من أسبوعين أو انتفاخ بالوجه أو عند حدوث ردود فعل تحسسية على الأدوية الموصوفة.

كما يجب المواظبة على حضور جميع المواعيد المحددة لاستكمال العلاج النهائي.

